My Forme Por Pomenico Ferreglis

EGIDIO FERUGLIO


SOSTITUZIONE DEL NOME DI UNA SPECIE DI SPHENOPTERIS DEL GIURESE DELLA PATAGONIA

(Estratto dalle « Pubblicazioni dell' Istituto Geologico della Università di Torino », fasc. II).





TORINO
TIPOGRAFIA VINCENZO BONA
1954



EGIDIO FERUGLIO

SOSTITUZIONE DEL NOME DI UNA SPECIE DI *SPHENOPTERIS*DEL GIURESE DELLA PATAGONIA

(Estratto dalle « Pubblicazioni dell'Istituto Geologico della Università di Torino », fasc. II).





EGIDIO FERUGLIO

Sostituzione del nome di una specie di Sphenopteris del Giurese della Patagonia

Il prof. W. J. Jongmans di Heerlen, avendo ricevuto copia del mio lavoro su alcune piante del Mesozoico della Patagonia, uscito due anni fa (1), ha avuto la cortesia di avvertirmi come il nome specifico della Sphenopteris delicatula, assegnato ad una forma da me descritta per la « Serie porfirica » (di età giurese-wealdiana) del Gran Bajo de San Julián, presso la costa atlantica della Patagonia australe (49° 24′ di lat.), sia stato già impiegato per lo stesso genere nel 1823 da Sternberg; nel 1898 da Shirley (Queensland), e nel 1932 da Kryshtofovich e Prynada (Ussuriland). Mentre sono grato all'illustre studioso dell'opportuno avviso, propongo che il nome della specie della Patagonia sia sostituito con quello di Sphenopteris sanjulianensis, dal nome della regione di provenienza.

Lo stesso prof. Jongmans, confrontando le figure della mia specie con quelle degli esemplari illustrati dallo Halle pel Giurese (probabilmente Giurese medio o superiore) della Baia della Speranza (Hope Bay, Terra di Graham), nell'Antartide occidentale, e dall'autore (2) identificati con la Sphenopteris nauckhoffiana (Heer) (3), del Neoco-

⁽¹⁾ Feruglio, E., *Piante del Mesozoico della Patagonia*, Pubblicazioni dell'Istituto Geologico della Università di Torino, fasc. I, Torino, 1951, pag. 42, tav. I, fig. 3-8; tav. II, fig. 1-2.

⁽²⁾ Halle, Th. G., The mesozoic flora of Graham Land, Wiss. Ergebnisse Schwed. Südpolar-Expedition, 1901-03, Band III, Lief. 14, Stockholm, 1913.

⁽³⁾ Descritta da Heer (Nachträge zur fossilen Flora Grönlands, Kongliga Svenska Vetenskaps-akademiens Handlingar, n. 5, XVIII, 2, 1880, pag. 3, tav. I, fig. 9-12) sotto il nome di Asplenium nauckhoffianum.






SPIEGAZIONE DELLA TAV. I

- Fig. 1. Sphenopteris nauchhoffiana (Heer). Originale della Hope Bay (Antartide occidentale), illustrato da Halle $(\times 4)$.
- Fig. 2 e 3a. Sphenopteris sanjulianensis Feruglio. Gran Bajo de San Julián (Patagonia), in grandezza naturale.
- Fig. 3b. Id., ingrandita 4 volte.

E. Feruglio, Sostituzione del nome, ecc.



SPIEGAZIONE DELLA TAV. II

Fig. 1a. – Sphenopteris sanjulianensis Feruglio. – Gran Bajo de San Julián (Patagonia), in grandezza naturale.

Fig. 1b. - Id., ingrandita 4 volte.

E. Feruglio, Sostituzione del nome, ecc.



SPIEGAZIONE DELLA TAV. III

Sphenopteris sanjulianensis Feruglio. – Gran Bajo de San Julián (Patagonia); esemplare della tav. I, fig. 2, ingrandito 4 volte.





